

Luisiana Centro de las ciencias de la salud de la universidad de estado
Departamento de la radiología de diagnóstico
Fije las instrucciones del procedimiento para el tipo 2 pacientes diabéticos que
siguen contraste del intravenoso

Después de que su examen en el departamento de la radiología usted pueda reasumir hoy su regular adiete. Es necesario que el contraste esté expelido de su cuerpo. Usted puede desear aumentar su producto flúido.

Usted debe retener su medicación hipoglicémica oral por 48 horas de procedimiento del poste. Será necesario que usted se vuelva al hospital sobre 48 horas para hacer sus niveles del BOLLO y de la creatinina comprobar. Los niveles necesitan ser repasados antes de usted comienzan a tomar su hipoglicémico oral (glugophage, metformin).

Durante horas normales de la clínica la clínica y el médico que se refieren serán responsables de obtener esta prueba. Sin embargo, si baja su período de 48 horas mientras que las clínicas son cerradas usted debe ir al cuarto de emergencia y hacer que paginen a radiólogo en llamada.

Sus necesidades y preocupaciones son importantes para nosotros. Si usted tiene cualesquiera preguntas, por favor llame (318) 675-6200 el departamento de la radiología de diagnóstico en LSUHSC. Nuestras horas normales de la operación son lunes hasta el viernes 7: 00am hasta 4:00 P.M.